

# LIMPIEZA DE VÓMITO Y DIARREA




## RETIRAR A LA PERSONA ENFERMA

Retire rápidamente a todos los empleados, clientes y otras personas enfermas del establecimiento




## RESTRINGIR EL ÁREA

Utilice cinta de precaución, conos, sillas u otras barreras efectivas para cerrar el área hasta que se complete la limpieza y la desinfección



## COLOCARSE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Utilice guantes descartables, mascarilla, red para el cabello, fundas para zapatos, traje, delantal o bata descartables



## APLICAR UN MATERIAL ABSORBENTE EN EL ÁREA

Utilice polvo o solidificador absorbente, piedras sanitarias para gatos o toallas de papel



## LIMPIAR O RECOGER

Colóquelo en una bolsa de plástico y selle la bolsa



## DESINFECTAR

Desinfecte todas las superficies de contacto con alimentos y sin contacto con alimentos afectadas con una solución de blanqueador (cloro) o vapor a 158°F (70°C)

- Mezcle la solución de cloro (blanqueador) que sea más fuerte que la solución de blanqueador utilizada para las desinfecciones generales (consulte la Tabla 1: Concentraciones del desinfectante)
- Si su centro no permite el uso de blanqueador, consulte la lista de EPA de desinfectantes aprobados para este propósito
- Desinfecte con vapor a 158°F durante cinco minutos o a 212°F durante un minuto para telas, alfombras o muebles



## DESECHAR

Deseche todos los artículos de descarte, incluidos guantes, batas, etc., y retire los residuos del edificio



## LAVARSE LAS MANOS

Frote las manos enérgicamente con agua y jabón durante al menos veinte (20) segundos

Tabla 1: Concentraciones del desinfectante

Blanqueador (concentración de hipoclorito)	Cantidad de agua	Cantidad de blanqueador	Concentración PPM
5,25 % regular	1 galón	1 2/3 taza	~5000
6 – 6,25 %	1 galón	1 1/2 taza	~5000
8,25 % concentrado	1 galón	1 taza	~5000

